

How to Use Naloxone Nasal Spray for an Opioid Overdose

.....

Act fast. A person who is overdosing may stop breathing. Don't hesitate to give naloxone. It is a very safe medication.

Signs of an Opioid Overdose

- Slow or labored breathing
- Making snoring or choking sounds
- Pale or moist skin
- Blue or gray coloring of the lips, hands, or feet

Steps to Respond to an Overdose

1

Check for a response

Gently shake the person and shout to wake them.

2

Call 9-1-1

Give your location and address if you know it.

3

Give naloxone (Narcan) nasal spray

- Do not test the device. It will only spray once.
- Place the person on their back.
- Place the tip of the nasal spray in one nostril.
- Press the plunger to release all the liquid into the nose.

4

Roll the person on to their side

5

Give a second dose of naloxone (Narcan), if needed

If the person isn't breathing after 1-2 minutes, give them a second dose.

6

Stay with the person until help arrives

- The Good Samaritan law gives you protections when you call 9-1-1.
- The person may feel sick or be scared or nervous. Try to keep them calm until help arrives.

Naloxone lasts 30-90 minutes. It's important to get medical assistance to avoid overdosing again.

Uso de aerosol nasal de naloxona para una sobredosis de opioides

Actúe rápido. Una persona que sufre una sobredosis puede parar de respirar, por lo que es importante administrarle naloxona rápidamente.

Los signos de una sobredosis

- Respiración lenta o dificultosa
- Hacer sonidos de ronquidos o asfixia
- Piel pálida o húmeda
- Coloración azul o gris de los labios, manos, o pies

Pasos para responder a una sobredosis de opioides

1

Busque una respuesta

Sacúdala suavemente y grite su nombre.

2

Llame al 9-1-1

Infórmele su ubicación y dirección si la conoce

3

Administre aerosol nasal de naloxona (Narcan)

- No pruebe el dispositivo. Funciona solamente una vez.
- Coloque a la persona boca arriba.
- Coloque la punta del aerosol en una fosa nasal.
- Presione el émbolo para inyectar todo el líquido en la nariz.

4

Acueste la persona de lado

5

Administre una segunda dosis de naloxona (Narcan), si es necesario

Si la persona no responde a la primera dosis de naloxona después de unos 1-2 minutos, déle una segunda dosis.

6

Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda

- La ley del Buen Samaritano le brinda protección cuando llama al 9-1-1.
- La persona puede estar asustada o nerviosa. Intente mantener la calma hasta que llegue la ayuda.

La naloxona dura de 30 a 90 minutos. Es importante obtener asistencia médica para evitar una sobredosis nuevamente.